



L'Hospital Clínic de Barcelona és el primer hospital de Catalunya que ha posat en marxa aquestes mesures on una vintena de nounats ja han estat vacunats. Les mesures que l'Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa van adreçades als nadons prematurs, a la mare (i parella) i al personal sanitari.

### **SOBRE EL PREMATUR:**

**MESURA 1.-** Adaptar el Calendari de vacunes a les recomanacions actuals de la Generalitat de Catalunya (juny 2018) que proposa en prematurs de menys de 32 setmanes i/o menys de 1.700 g de pes al naixement, la "pauta 3 + 1" (tres vacunes més seguides i una més separada) de les vacunes Hexavalent i Pneumocòccica 13-valent (abans es feia 2 +1). Per facilitar el seu compliment al personal sanitari d'Atenció Primària s'ha elaborat un full- calendari adaptat que s'enganxa en el Carnet de Salut.

**MESURA 2.-** Seguir vacunant als 2 mesos d'edat cronològica de les vacunes del calendari actual (Hexavalent i Pneumocòccica-13-valent).

**MESURA 3.-** Administrar la primera dosi de vacuna oral del Rotavirus als prematurs que romanguin ingressats als 2 mesos d'edat cronològica, i es recomana la seva continuació després de l'alta hospitalària.

**MESURA 4.-** Vacunar de Meningococ B als prematurs que als 3 mesos de vida romanguin ingressats a la unitat Neonatal, i es recomana igualment completar la "pauta 2 + 1" després de l'alta.

### **En resum:**

Hexavalent (Diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, *Haemophilus influenzae B*, hepatitis B)

- **ABANS:** Es vacunaven als 2, 4 i 11 mesos
- **ARA:** Es vacunen 2, 4, 6 i 18 mesos

Rotavirus i Meningococ B (Gastroenteritis per Rotavirus (major incidència d'ingrés hospitalari en prematurs) i malaltia invasiva per Meningococ B (sèpsia i meningitis, principalment)

- **ABANS:** No es posaven durant l'ingrés
- **ARA:** Es posen als 2 mesos Rotavirus i als 3 mesos Meningococo B.

Pneumococ /malalties invasives per Pneumococ (sèpsia, meningitis, pneumònia, otitis mitjana)

- **ABANS:** Es posaven als 2, 4 i 11 mesos
- **ARA:** Es posen 2, 4, 6 i 18 mesos.



## **SOBRE LA MARE I LA PARELLA:**

**MESURA 5.-** Oferir la vacuna de la tos ferina, inclosa dins de la vacuna Tdpa, en el postpart a les mares que no ha donat temps a vacunar durant la gestació i les seves parelles ("estratègia del Niu davant infecció per *Bordetella pertussis*").

**MESURA 6.-** Seguir oferint la vacuna de la grip, administrada al propi hospital, en temporada d'hivern, a les mares i les seves parelles, en el postpart, i recordar la recomanació d'immunització de la resta de convivents. A partir dels 6 mesos d'edat, considerar vacunar també als prematurs, especialment si tenen malaltia respiratòria o neurològica de base.